

RECONSTITUTION ET PRISE D'UN PEPTIDE

A. Reconstitution

I. Prérequis:

- x2 seringues à insuline stériles*
- x1 flacon d'eau bactériostatique
- x3 tampons à alcool
- x1 flacon de peptide lyophilisé**

II. Préparation de l'environnement:

- Lavez puis désinfectez vous les mains***
- Utiliser x1 tampon à alcool afin de désinfectez votre plan de travail et jetez le.
- Décapsulez le flacon d'eau bactériostatique ainsi que le flacon du peptide.
- Désinfectez le dessus des deux flacons à l'aide d'un nouveau tampon d'alcool.

III. Pré injection:

- Via une seringue, prenez la quantité nécessaire d'eau bactériostatique (**VOIR TABLEAU CI DESSOUS**) et injectez la dans le flacon du peptide, de biais, sur la parois du flacon en verre et non directement sur la poudre de façon très lente et progressive.
- Laissez la poudre se dissoudre pendant 1 à 2 minutes.
- Remuez très délicatement (**NE PAS AGITER**) en faisant rouler le flacon entre vos doigts jusqu'à que la poudre devienne complètement homogène et transparente.
- Laissez reposer le flacon à température ambiante pendant 3 minutes.
- Inscrivez la date du jour de la reconstitution sur le flacon
- Conservez au réfrigérateur entre 4 et 8 degrés en permanence

[UTILISEZ NOTRE CALCULATRICE INTERACTIVE](#)

continuez ci-dessous


RECONSTITUTION ET PRISE D'UN PEPTIDE

B. Administration

I. Posologie de la reconstitution:

- Il faut connaître la dose exacte de reconstitution, elle vous a été communiquée lors de votre achat*
- Conservez votre eau bactériostatique pendant 1 mois maximum à température ambiante, à l'abris de la lumière.

[UTILISEZ NOTRE CALCULATRICE INTERACTIVE](#)



Quantité de peptides en mg	Quantité d'eau bactériostatique en mL	Échelle sur la seringue d'1mL
1mg à 5mg	1mL	100 unités (seringue entière - cf. image)
6mg à 10mg	2mL	200 unités (deux seringues)**
+10mg	3mL	300 unités (trois seringues)**

continuez ci-dessous

*En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter.

**Vous n'avez pas besoin de jeter la seringue, remplissez la, videz la et répétez l'opération le nombre exact de fois que cela est indiqué.

RECONSTITUTION ET PRISE D'UN PEPTIDE

B. Administration

II. Posologie de l'injection:

- Il faut connaître la dose exacte de votre traitement, elle vous a été communiquée lors de votre achat* [UTILISEZ NOTRE CALCULATRICE INTERACTIVE](#)
- Conservez votre peptide au réfrigérateur pendant 60 jours, ne le sortez qu'uniquement pour l'injection et ne le laissez pas dehors plus de 10 minutes.**
- Ne jamais réutiliser une seringue déjà utilisée.
- Respectez **absolument** les doses qui vous ont été conseillés.
- En cas d'effets secondaires, contactez nous.



Dose en mg	Quantité en mL
1mg	20 unités (0.2mL)
2mg	40 unités (0.6mL)
3mg	60 unités (0.6mL)

*En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter.

**Certains peptides doivent être conservés à l'abri de la lumière, vous serez mit au courant lors de votre commande si votre peptide est photosensible.

RECONSTITUTION ET PRISE D'UN PEPTIDE

B. Administration

III. L'injection

- La méthode d'injection vous a été communiquée lors de votre commande (voir image 1)*
- Soyez dénudé dans la zone d'injection (sans haut si vous injectez dans le haut du corps, sans pantalon si vous injectez dans le bas du corps).
- Désinfectez la zone d'injection avec un tampon à alcool et attendez que l'alcool sèche.
- Tirer votre seringue jusqu'à avoir atteint votre dose en mL ([LIEN CALCULATRICE](#))
- Penchez l'aiguille et pincez votre peau (voir image 2 et 3)
- Injectez uniquement dans des endroits gras (près du nombril, poignées d'amour, cuisses, haut des fesses).
- Changez à chaque fois de point d'injection.




IMAGE 1




IMAGE 2



IMAGE 3

*Dans de rares cas, certains peptides doivent être injectés en intramusculaire, si vous n'avez pas été mit au courant, c'est que cela ne concerne pas le votre et donc que vous devez vous l'administrer en sous cutané.



vectaresearch@proton.me
vecta-research.vercel.app